



**Natriumhyaluronat 0,2% m/V**  
**Augentropfen 10 ml**  
 Benetzender Schutz  
 für trockene Augen  
 Konservierungsmittelfrei im Auge

**DE Gebrauchsinformation**

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® HA beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker, oder Optiker.

**Was ist Xailin® HA?**

Xailin® HA sind benetzende Augentropfen im Mehrdosis-system zur Linderung der Symptome bei mittlerem bis schwerem Trockenheitsgefühl am Auge. Die Packung enthält 10 ml sterile, isotonische Augentropfen.

**Zusammensetzung:**

Xailin® HA Augentropfen enthalten Natriumhyaluronat 0,2 % m/V und Natriumperborat in wässriger, gepufferter Trägerlösung. Xailin® HA enthält eine hochreine, spezifische Fraktion von Hyaluronsäure-Natriumsalz, welches durch Bakterienfermentation gewonnen wird, und ist daher frei von tierischen Eiweißen.

Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes, bioverträgliches Polysaccharid mit einzigartigen viskoelastischen und hygroscopischen Eigenschaften. Im Auge kommt Hyaluronsäure im Glaskörper, in den Tränenrüben, dem Hornhautepithel, der Bindehaut und der menschlichen Tränenflüssigkeit vor. Hyaluronsäure besitzt mukoadhäsive Eigenschaften und die Fähigkeit, Wasser zu binden, und sie ist dafür bekannt, die Wasserverteilung im Hornhautstroma zu beeinflussen. Zusammen mit den filmbildenden Eigenschaften der Hyaluronsäure führt dies zu einer erhöhten präkornealen Verweildauer und Tränenfilmauflöszeit und damit zu einer längeren Benetzung der Hornhautoberfläche. Hyaluronsäure wird derzeit Kontaktlinseprodukten zugesetzt, um die Benetzung und den Tragekomfort von Kontaktlinsen zu erhöhen.

Xailin® HA enthält ein verschwindendes Konservierungsmittel, das beim Kontakt mit Ihrem Auge in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Damit wird die Reizung, die von traditionellen Konservierungsmitteln ausgehen kann, minimiert und dennoch der Komfort eines Mehrdosis-system beibehalten. Sie spüren nur die wohltuende Linderung durch die Augentropfen.

**Wann wird es angewendet?**

Xailin® HA wird bei bestimmten Augenerkrankungen zur Benetzung und zum Schutz des Auges angewendet. Xailin® HA schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten. Xailin® HA ist für Kontaktlinsträger geeignet.

**Wie wird es angewendet:**

Die übliche Dosis ist ein oder zwei Tropfen, je nach Bedarf 2 bis 4-mal täglich anwendbar, oder nach Anweisung Ihres Arztes, der Ihnen eine andere Anwendung empfehlen kann. Bei Kindern ist keine Dosisanpassung erforderlich.

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen einer neuen Flasche Xailin® HA, dass der Sicherheitsring an der Flaschenkappe unversehrt ist.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig vor der Anwendung.
2. Drehen Sie die Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Siegel zu brechen.
3. Nehmen Sie die Kappe ab.
4. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
5. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
6. Halten Sie das Fläschchen zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drücken Sie mit dem Zeigefinger leicht auf den Flaschenboden, um einen Tropfen Xailin® HA Augentropfen in die Lidtasche zu geben.
7. Blinzeln Sie mehrere Male.
8. Wenn Sie glauben, dass Sie das Auge verfehlt haben, bringen Sie einen weiteren Tropfen ein.
9. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssige Xailin® HA Augentropfen um das Augenlid ab.
10. Setzen Sie die Kappe wieder auf das Behältnis. Vermeiden Sie dabei, die Applikatorspitze mit etwas zu berühren, einschließlich Ihres Auges oder Ihrer Finger.
11. Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig nach der Anwendung.
12. Halten Sie zwischen der Anwendung und der anderer Augenarzneimittel einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein.
13. Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Xailin® HA anwenden sollen, oder falls Ihre Augenbeschwerden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker, oder Optiker.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

- Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring an der Flaschenkappe beschädigt ist.
- Nicht anwenden, wenn Sie auf das Produkt allergisch reagieren.
- Die Spitze der Flasche nicht mit dem Auge oder einer Oberfläche berühren.
- Verwenden Sie Xailin® HA nicht gemeinsam mit einer anderen Person.
- Xailin® HA kann nach der Anwendung zu geringfügigem Verschwommensehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.
- Wenn Sie anhaltende Augenbeschwerden erleben, Schwellung oder Rötung des Auges, die Verwendung von Xailin® HA und konsultieren Sie Ihren Augenarzt.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder auf der Flasche angegeben ist.
- Zwischen 1°C und 25°C lagern.
- Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
- Nur zur äußeren Anwendung am Auge, nicht schlucken.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen oder vor kurzem einem ophthalmologischen Eingriff unterzogen wurden, fragen Sie vor Anwendung von Xailin® HA Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
- Entsorgen Sie die angebrochene Flasche entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften.

Zwischen 1°C und 25°C lagern

Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen

Achtung: Lesen Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsinformation

Durch keimfreie Herstellungstechniken sterilisiert

Xailin® ist eine Handelsmarke von VISUFarma  
 Stand der Information: Juli 2020

**Vertrieb durch VISUFarma BV**  
 Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande  
 info@visufarma.com

**Medicom Healthcare Ireland Ltd.,**  
 Joyce House, 21-23 Holles Street,  
 Dublin 2, Irland.

**Medicom Healthcare Ltd.,**  
 Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
 Kings Cross, London, WC1H 9LT,  
 Vereinigtes Königreich



**Hyaluronate de sodium 0,2% p/v**  
**Collyre 10 ml**  
 Lubrification et protection de l'œil contre  
 les sensations de sécheresse oculaire  
 Sans conservateur dans l'œil

**FR Mode d'emploi**

Il est important de lire ce document attentivement avant d'utiliser Xailin® HA. Les informations qu'il contient résumément les caractéristiques essentielles du produit. Si vous avez d'autres questions, renseignez-vous auprès de votre médecin, ou de votre pharmacien.

**Qu'est-ce que Xailin® HA ?**

Xailin® HA est un collyre lubrifiant multi-doses pour soulager les symptômes de sensations de sécheresse oculaire modérée à sévère. Le flacon contient 10 ml de collyre isotonique stérile.

**Composition :**

Xailin® HA Collyre contient du hyaluronate de sodium à 0,2 % p/v et du perborate de sodium dans une solution aqueuse tamponnée. Xailin® HA contient une fraction spécifique hautement purifiée de hyaluronate de sodium (sel sodique de l'acide hyaluronique) produit par fermentation bactérienne et est par conséquent exempt de protéines animales. L'acide hyaluronique est un polysaccharide biocompatible, d'origine naturelle, offrant des propriétés viscoélastiques et hygroscopiques uniques. Dans l'œil humain, l'acide hyaluronique se trouve dans le vitré, les glandes lacrymales, l'épithélium cornéen, la conjonctive, et les larmes. L'acide hyaluronique possède des propriétés muco-adhésives ainsi que la capacité à piéger l'eau ; il est connu pour influencer la répartition de l'eau dans le stroma cornéen. Ceci, combiné aux propriétés couvrantes de l'acide hyaluronique, entraîne une augmentation de la durée de contact pré-cornéen et du temps de rupture du film lacrymal, résultant donc en une lubrification de plus longue durée de la surface de la cornée. L'acide hyaluronique est ajouté aux produits destinés aux lentilles de contact pour améliorer l'humidification et le confort du port de celles-ci.

Xailin® HA contient un conservateur qui se transforme en eau et en oxygène au contact de l'œil, minimisant ainsi l'irritation qui peut être occasionnée par les conservateurs classiques, tout en offrant la commodité d'une présentation multi-doses. Vous ne ressentez que l'effet de soulagement que vous procure le collyre.

**Quand faut-il utiliser ?**

Xailin® HA est utilisé pour lubrifier et protéger l'œil dans certaines affections oculaires. Xailin® HA apaise et soulage les symptômes de sensations de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation, ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Xailin® HA peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

**Comment l'utiliser :**

La dose habituelle est d'une à deux gouttes à instiller 2 à 4 fois par jour selon les besoins, ou selon les instructions de votre professionnel de santé, qui peut vous recommander d'utiliser ce produit d'une manière différente. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez l'enfant.

Avant d'ouvrir un nouveau flacon de Xailin® HA, veuillez vérifier que la bande de sécurité sur le bouchon du flacon est intacte.

1. Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation.
2. Dévissez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rompre le joint.
3. Retirez le bouchon.
4. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut.
5. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière.
6. Tenez le flacon entre le pouce et le majeur de l'autre main, et, avec l'index, appliquez une pression modérée à la base du flacon de collyre pour instiller une goutte de Xailin® HA Collyre dans le petit espace dégagé.
7. Clignez des yeux plusieurs fois.
8. Si vous pensez que la goutte n'a pas atteint votre œil, instillez une seconde goutte.
9. Essayez soigneusement tout excès de Xailin® HA Collyre autour de la paupière avec un mouchoir.
10. Revissez le bouchon sur le flacon, en essayant de ne pas toucher quoique ce soit avec l'embout de l'applicateur, y compris l'œil ou les doigts.
11. Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.
12. Attendez au moins 30 minutes avant de vous administrer tout autre médicament ophtalmique.
13. Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de Xailin® HA ou si vos problèmes oculaires persistent, consultez votre médecin, votre pharmacien, ou votre opticien.

**Précautions et avertissements :**

- Ne pas utiliser si la bague de sécurité sur le bouchon du flacon n'est pas intacte.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique au produit.
- Ne pas toucher l'œil ou toute autre surface avec l'extrémité du flacon.
- Ne partager Xailin® HA avec aucune autre personne.
- Xailin® HA peut provoquer une vision floue temporaire après l'application. Attendre que la vision normale soit rétablie avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.
- Si vous ressentez un malaise oculaire persistant, un gonflement ou une rougeur de l'œil, n'utilisez pas de Xailin® HA et consultez votre ophtalmologue.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou imprimée sur le flacon.
- Conserver entre 1°C et 25°C.
- Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture.
- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- Usage oculaire externe uniquement, ne pas avaler.
- Consulter un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser Xailin® HA en cas de grossesse, d'allaitement ou si vous avez récemment subi une intervention ophtalmique.
- Jeter le flacon utilisé conformément à la réglementation locale d'élimination des déchets.

Conserver entre 1°C et 25°C

Jeter le contenu 28 jours après la première ouverture

Attention : lisez tous les avertissements et toutes les précautions dans le mode d'emploi

Stérilisé par des techniques de traitement aseptiques

Xailin® est une marque de VISUFarma  
 Dernière révision du texte : Juillet 2020

**Distribué par VISUFarma BV**  
 Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Pays-Bas  
 info@visufarma.com

**Medicom Healthcare Ireland Ltd.,**  
 Joyce House, 21-23 Holles Street,  
 Dublin 2, Irlande.

**Medicom Healthcare Ltd.,**  
 Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
 Kings Cross, London, WC1H 9LT,  
 Royaume-Uni



4-SDHY-2IMD-24-ME-PPV3  
 AW-00085 Rev. 3

**NL Gebruiksaanwijzing**

Het is belangrijk deze bijsluiters zorgvuldig te lezen voordat u Xailin® HA gaat gebruiken. De geleverde informatie vat de belangrijke punten over het product samen, maar als u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht bij uw arts, apotheker, of opticien.

**Wat is Xailin® HA?**

Xailin® HA is een multidosis smerende oogdruppel voor het verlichten van symptomen van matig tot ernstig droge ogen. De verpakking bevat 10 ml steriele isotone oogdruppels.

**Samenstelling:**

Xailin® HA oogdruppels bevatten natriumhyaluronaat 0,2% gewicht/volume en natriumperboraat in waterig gebufferd medium.

Xailin® HA bevat een sterk gezuiverde specifieke fractie van natriumzout van hyaluronzuur dat door bacteriële gisting wordt geproduceerd en daarom vrij is van dierlijke eiwitten.

Hyaluronzuur is een van nature aanwezige, biocompatibele polysaccharide met unieke viscoelastische en hygroscopische eigenschappen. In het oog is hyaluronzuur aanwezig in het glasachtige lichaam, de traanklier, de corneale epitheel, het bindvlies, en het menselijke traanvocht. Hyaluronzuur beschikt over mucoadhesieve eigenschappen en het vermogen om water in te sluiten en heeft invloed op de distributie van water in het corneale stroma. Dit leidt samen met de dekkende eigenschappen van hyaluronzuur tot een langere precorneale verblijfstijd en traanfilmafbraaktijd en zodoende tot een langere smering van het hoornvliesoppervlak. Hyaluronzuur wordt momenteel toegevoegd aan contactlensproducten om de vochtigheid en het comfort van contactlenzen te verbeteren.

Xailin® HA bevat een in water en zuurstof veranderend conserveringsmiddel zodra het in contact komt met uw oog, waardoor irritatie die kan worden veroorzaakt door traditionele conserveringsmiddelen tot een minimum wordt beperkt, terwijl het gemak van een multidosisformule behouden blijft. U voelt alleen de verzachtende werking van de oogdruppels.

**Wanneer moet het gebruikt worden?**

Xailin® HA wordt gebruikt om het oog te smeren en te beschermen bij bepaalde oogaandoeningen. Xailin® HA zorgt voor verlichting van symptomen van droge ogen, met name bij pijn, irritatie, of een zanderig gevoel. Symptomen van droge ogen treden op als gevolg van aandoeningen van het oogoppervlak, die verschillende oorzaken kunnen hebben en waarbij normale tranen van slechte kwaliteit zijn of te weinig worden geproduceerd om het oog voldoende vochtig te houden. Xailin® HA kan worden gebruikt door contactlensdragers.


**Hoe wordt het gebruikt:**

De gebruikelijke dosering is twee tot vier maal daags één of twee druppels of zoals voorgeschreven door uw arts, apotheker of opticien die u kan adviseren om dit product op een andere manier te gebruiken. De dosering hoeft niet te worden aangepast bij kinderen. Controleer voordat u een nieuw flesje Xailin® HA opent of de veiligheidsring op de dop van het flesje intact is.

1. Was en droog uw handen goed voor gebruik.
2. Draai de dop linksom om de verzegeling te verbreken.
3. Verwijder de dop.
4. Kantel uw hoofd naar achteren en kijk omhoog.
5. Trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag om een kleine opening tussen uw ooglid en uw oog te vormen.
6. Houd het flesje tussen uw duim en middelvinger van de andere hand en druk met uw wijsvinger in de onderkant van het flesje om een druppel Xailin® HA Oogdruppels aan te brengen in de opening.
7. Knipper een paar keer met uw oog.
8. Als u denkt dat u het oog hebt gemist, breng dan nog een druppel in.
9. Veeg eventueel overtollig Xailin® HA Oogdruppels rond het ooglid voorzichtig weg met een tissue.
10. Plaats de dop terug op het flesje en probeer daarbij het uiteinde van de applicator niet aan te raken met uw oog, vingers of andere voorwerpen.
11. Was uw handen goed na gebruik.
12. Wacht minimaal 30 minuten voordat u andere geneesmiddelen in uw oog toedient.
13. Als u niet zeker weet hoe u Xailin® HA moet gebruiken of als uw oogaandoening blijft aanhouden, raadpleeg dan uw arts, apotheker, of opticien.


**Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:**

- Niet gebruiken als de veiligheidsring op de dop van het flesje niet meer intact is.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor het product.
- Raak het topje van het flesje niet aan met uw oog of een ander oppervlak.
- Deel Xailin® HA niet met andere personen.
- Xailin® HA kan na het aanbrengen een licht verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. Wacht tot uw zicht helder is voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat gebruiken.
- Als u hardnekkig oogongemak, zwelling of roodheid van het oog ervaart, stop met het gebruik van de Xailin® HA en raadpleeg uw oogverzorger.
- Niet gebruiken na de op de doos of het flesje vermelde uiterste gebruiksdatum.
- Bewaren tussen 1°C en 25°C.
- Gooi de inhoud 28 dagen na de eerste opening weg.
- Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
- Uitsluitend voor extern oculair gebruik, niet doorslikken.
- Raadpleeg uw arts, apotheker of opticien voordat u Xailin® HA gaat gebruiken als u zwanger bent, borstvoeding geeft of onlangs een ophthalmische procedure heeft ondergaan.
- Gooi het gebruikte flesje weg volgens de plaatselijke voorschriften met betrekking tot afvalbeheer.

 Bewaren tussen 1°C en 25°C

 Gooi de inhoud 28 dagen na de eerste opening weg

 Let op: Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing

 Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken

Xailin® is een handelsmerk van VISUfarma  
Laatste herziening van de tekst: Juli 2020

**gedistribueerd door VISUfarma BV**  
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Nederland  
info@visufarma.com

 **Medicom Healthcare Ireland Ltd.,**  
Joyce House, 21-23 Holles Street,  
Dublin 2, Ierland.

 **Medicom Healthcare Ltd.,**  
Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
Kings Cross, London, WC1H 9LT,  
Verenigd Koninkrijk



**RO Instrucțiuni de utilizare**

Este important să citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe să utilizați Xailin® HA. Informațiile cuprinse în acest prospect sumarizează principalele puncte referitoare la acest produs, dar dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

**Ce este Xailin® HA?**

Xailin® HA este o soluție oftalmică multidoză, lubrifiantă, folosită pentru ameliorarea simptomelor moderate sau severe ale ochiului uscat. Flaconul conține 10 ml soluție oftalmică, izotonică, sterilă.

**Compoziție:**

Xailin® HA picături oftalmice conține hialuronat de sodiu 0.2% m/v și perborat de sodiu în soluție apoasă tamponată.

Xailin® HA conține o fracțiune specifică, înalt purificată de hialuronat de sodiu (sare sodică a acidului hialuronic) produsă prin fermentație bacteriană și este în consecință lipsită de proteine de origine animală. Acidul hialuronic este un polizaharid biocompatibil, de origine naturală, cu proprietăți vâsco-elastice și higroscopice unice. La nivelul ochiului uman, acidul hialuronic se află în corpul vitros, în glandele lacrimale, în epiteliul corneean, în conjunctivă, și în secreția lacrimală. Acidul hialuronic are proprietăți muco-adezive, are capacitatea de a atrage apa și este cunoscut că influențează distribuția apei în stroma corneeană. Aceasta, împreună cu proprietatea de acoperire a acidului hialuronic, duce la creșterea duratei de contact pre-cornean și a timpului de întrerupere a filmului lacrimal, având ca rezultat o lubrifiere de mai lungă durată a suprafeței corneei. Acidul hialuronic este adăugat în produsele destinate purtătorilor de lentile de contact, pentru ameliorarea umectării ochiului și îmbunătățirea confortului.

Xailin® HA conține un conservant care dispare la contactul cu ochiul transformându-se în apă și oxigen, reducând la minimum iritația care poate fi cauzată de conservanții tradiționali și oferind în același timp comoditatea forme multidoză. Tot ce veți simți este efectul liniștitor după administrarea picăturilor oftalmice.

**Când se utilizează?**

Xailin® HA este utilizat pentru lubrifierea și protejarea ochiului în anumite afecțiuni oculare. Xailin® HA ameliorează simptomele provocate de uscăciunea ochiului, cum ar fi durerea, iritația, sau senzația de corp străin. Simptomele de ochi uscat apar ca rezultat al tulburărilor de la suprafața ochiului care pot avea numeroase cauze și care modifică secreția lacrimală normală, fie prin scăderea calității secreției lacrimale fie prin reducerea cantității acesteia, iar ochiul este insuficient hidratat. Xailin® HA poate fi folosit de purtătorii de lentile de contact.

**Cum se utilizează:**

Doza uzuală este de una sau două picături de 2 până la 4 ori pe zi, în funcție de necesitate, sau în funcție de recomandarea medicului, farmacistului sau opticianului, care vă pot recomanda utilizarea acestui produs într-o manieră diferită. Nu este necesară ajustarea dozei la copii. Înainte de deschiderea unui flacon nou de Xailin® HA, verificați dacă banda de siguranță aplicată pe capacul flaconului este intactă.


1. Spălați-vă și uscați-vă bine mâinile înainte de a utiliza.
2. Rotiți capacul flaconului în sens antiorar pentru a rupe sigiliul.
3. Scoateți capacul flaconului.
4. Înclinați capul spre spate și priviți în sus.
5. Trageți ușor de pleoapa inferioară în jos pentru a crea un mic spațiu între ochi și pleoapă.
6. Țineți flaconul între degetul mare și indexul celeilalte mâini și aplicați o presiune moderată la baza flaconului pentru a instila o picătură de Xailin® HA Picături Oftalmice în spațiul dintre ochi și pleoapă.
7. Clipiți de câteva ori.
8. Dacă credeți că picătura nu a ajuns la ochi, aplicați o a doua picătură.
9. Îndepărtați cu grijă excesul de Xailin® HA Picături Oftalmice din jurul pleoapelor cu ajutorul unui șervețel.
10. Puneți capacul flaconului încercând să nu atingeți aplicatorul cu nimic inclusiv cu ochiul sau cu degetele.
11. Spălați-vă bine pe mâini după utilizare.
12. Așteptați cel puțin 30 minute înainte de administrarea oricărui alt medicament oftalmic.
13. Dacă aveți orice nelămurire despre cum să utilizați Xailin® HA sau dacă simptomele persistă consultați medicul, farmacistul, sau opticianul.

**Precauții și atenționări:**

- Nu utilizați dacă inelul de siguranță care sigilează capacul flaconului este rupt.
- Nu utilizați dacă sunteți alergic la produs.
- Nu atingeți vârful flaconului cu ochiul sau cu orice altă suprafață.
- Nu împărțiți Xailin® HA cu altă persoană.
- Xailin® HA poate cauza tulburări minore de claritate a vederii după aplicare. Așteptați ca vederea dumneavoastră să devină clară înainte să conduceți sau să folosiți utilitaje.
- Dacă simțiți disconfort ocular persistent, umflătură sau roșeață a ochiului, încetați să utilizați Xailin® HA și consultați medicul curant.
- Nu utilizați Xailin® HA după data de expirare înscrisă pe cutie sau imprimată pe flacon.
- A se păstra la temperaturi cuprinse între 1°C și 25°C.
- Aruncați flaconul după 28 de zile de la prima deschidere.
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- Numai pentru uz oftalmic extern, a nu se înghiți.
- Cereți sfatul medicului sau farmacistului înainte de a utiliza Xailin® HA dacă sunteți gravidă, dacă alăptați sau dacă ați suferit recent o intervenție oftalmologică.
- Aruncați flaconul utilizat în conformitate cu regulamentele locale de eliminare a deșeurilor.

 A se păstra la temperaturi cuprinse între 1°C și 25°C.

 Aruncați flaconul după 28 de zile de la prima deschidere.

 Atenție: Citiți toate avertismentele și precauții în instrucțiunile de utilizare

 Sterilizat prin procedee tehnice aseptice.

Xailin® este o marcă comercială a VISUfarma  
Ultima revizuire a textului: Iulie 2020

**Distribuit de VISUfarma BV**  
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Olanda  
info@visufarma.com

 **Medicom Healthcare Ireland Ltd.,**  
Joyce House, 21-23 Holles Street,  
Dublin 2, Irlanda.

 **Medicom Healthcare Ltd.,**  
Lynton House, 7-12 Tavistock Square,  
Kings Cross, London, WC1H 9LT,  
Regatul Unit

