

VisuECTOINE®

BEFEUCHTENDE AUGENTROPFEN

BESCHREIBUNG

VisuECTOINE® sind sterile Augentropfen zur Befeuchtung der Augenoberfläche, basierend auf Ectoin, Natriumhyaluronat und Natriumcarboxymethylcellulose. VisuECTOINE® Augentropfen sind steril, pH-Wertgepuffert, phosphat- und konservierungsmittelfrei.

ZUSAMMENSETZUNG

VisuECTOINE® enthält Ectoin, Natriumcarboxymethylcellulose, hochmolekulares Natriumhyaluronat, Salze in Arzneibuchqualität und gereinigtes Wasser

Inhalt	% [w/w]
Ectoin	2
Natriumhyaluronat	0,1
Natriumcarboxymethylcellulose	0,15
Dinatriumtetraborat-Decahydrat	0,1
Borsäure	0,8
Gereinigtes Wasser	q.s. 100

INHALT DER PACKUNG

VisuECTOINE® wird in Einzeldosis-Ampullen aus Polyethylen niedriger Dichte angeboten, welche 0,4 ml des sterilen Produkts enthalten. Jede Packung enthält 30 Einzeldosis-Ampullen.

ANWENDUNGSGEBIETE

VisuECTOINE® sind Augentropfen zur Linderung von Augentrockenheit und -reizungen, die durch Umwelteinflüsse (Wind, Staub, Rauch, Klimaanlage, trockene Hitze), längeres Arbeiten an Bildschirmen oder Tragen von Kontaktlinsen und/oder bestimmte Augenkrankheiten, die diese Symptome hervorrufen, verursacht werden.

EIGENSCHAFTEN

VisuECTOINE® lindert das Trockenheitsgefühl und die Trockenheit der Augen. VisuECTOINE® lindert Augenreizungen. VisuECTOINE® schützt vor externen Allergenen und lindert Allergiesymptome. VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

VisuECTOINE® wird direkt auf der Oberfläche des Auges angewendet. Bevor Sie eine neue Einzeldosis-Ampulle von VisuECTOINE® verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Kappendichtung unbeschädigt und das Produkt unverseht ist. Die Lösung muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden. Der Tropfer darf nicht mit dem Auge oder einer anderen Oberfläche in Berührung kommen, um eine eventuelle Verunreinigung von Tropfer oder Lösung zu vermeiden. Älteren Menschen und bei Problemen mit der Handhabung wird empfohlen, sich bei der ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts helfen zu lassen. Die empfohlene Dosis beträgt ein oder zwei Tropfen in jedes betroffene Auge so oft wie nötig oder wie von Ihrem Facharzt verordnet.

HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

1. Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
2. Trennen Sie eine Einheit aus dem Streifen der Einzeldosis-Ampullen.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Einzeldosis-Ampulle nicht beschädigt ist.
4. Drehen Sie die Kappe, um die Einzeldosis-Ampulle zu öffnen.
5. Entfernen Sie die Kappe.
6. Neigen Sie den Kopf zurück und schauen Sie nach oben.
7. Ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid nach unten, um eine kleine „Tasche“ zwischen dem Augenlid und dem Auge zu bilden.
8. Halten Sie die Ampulle mit der anderen Hand zwischen Daumen und Mittelfinger und drücken Sie diese sanft zusammen, um ein oder zwei Tropfen in die Tasche des Augenlides zu geben.
9. Blinzeln Sie mehrmals, um die Tropfen gleichmäßig auf der Augenoberfläche zu verteilen.
10. Wurde der Tropfen nicht aufgenommen, wiederholen Sie den Vorgang.
11. Tupfen Sie die Produktreste um das Augenlid herum vorsichtig mit einer Mullkompressen ab.

12. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Auge.

13. Entsorgen Sie die geöffnete Einzeldosis-Ampulle (die geöffnete Ampulle nicht für weitere Anwendungen wiederverwenden, Infektionsgefahr).

GEGENANZEIGEN

VisuECTOINE® ist nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure und/oder andere Bestandteile des Produkts.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Berühren Sie die Spitze der Ampulle nicht mit dem Auge oder einer Oberfläche.
- Geben Sie das Produkt nicht an andere weiter.
- Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen kann verschwommenes Sehen auftreten. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen, bevor Sie Aktivitäten ausführen, die aufgrund der verschwommenen Sicht eventuell gefährlich sind.
- Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton oder der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.
- Bei Kindern und Jugendlichen mit Vorsicht anwenden (es liegen keine Daten zur Verwendung bei Minderjährigen vor).
- Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht einnehmen.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, Apotheker oder Optiker, bevor Sie das Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.

WECHSELWIRKUNGEN

Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden, die quartäre Ammoniumsalze wie Benzalkoniumchlorid enthalten, da Natriumhyaluronat in Verbindung mit diesen ausfallen kann. Warten Sie nach der Anwendung von VisuECTOINE® mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt oder Medikament am Auge anwenden. VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Nach dem Einsetzen der Kontaktlinsen wird empfohlen, vor der Anwendung der Tropfen etwa 30 Minuten zu warten, um Unverträglichkeitsreaktionen zwischen den zur Pflege der Kontaktlinsen verwendeten Produkten und VisuECTOINE® zu vermeiden.

NEBENWIRKUNGEN

VisuECTOINE® ist gut verträglich. In einigen Fällen kann VisuECTOINE® vorübergehend Augenreizungen, verschwommenes Sehen, Fremdkörpergefühl oder Augenrötung verursachen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von VisuECTOINE® bemerken. Wenn diese Nebenwirkungen fortbestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

LAGERUNG

Zwischen 5°C und 25°C lagern. Nicht einfrieren. Einzeldosis-Ampullen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Einzeldosis-Ampullen in der Originalverpackung aufbewahren.

VERFALLDATUM

Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

i+Med S. Coop. C/Albert Einstein,
15 Parque Tecnológico de Alava,
01510 Victoria-Gasteiz, Araba (Spanien)
www.imasmed.com

VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL
info@visufarma.com

VISUfarma
the eye health company

