



Hialuronato de sodio 0,2% p/v
10 ml Gotas Oftálmicas
Protección lubricante para
sensaciones de ojos secos
Sin conservantes en el ojo

ES Instrucciones de utilización

Es importante leer detenidamente este folleto antes de usar Xilin® HA. La información suministrada resume los aspectos importantes del producto pero si tiene alguna duda, consulte con su médico, farmacéutico, u óptico.

¿Qué es el Xilin® HA?

Xilin® HA son gotas oftálmicas, multidosis, destinadas a aliviar los síntomas moderados a severos de las sensaciones de ojo seco. El embalaje contiene 10 ml de gotas oftálmicas isotónicas estériles.

Composición:

Xilin® HA, gotas oftálmicas contiene hialuronato de sodio al 0,2% p/v, perborato de sodio en un vehículo acuoso tamponado.

Xilin® HA contiene una fracción específica altamente purificada de sal de sodio de ácido hialurónico, producida por fermentación bacteriana y por lo tanto libre de proteínas animales. El ácido hialurónico es un polisacárido natural biocompatible con propiedades viscoelásticas e higroscópicas excepcionales. En el ojo, se puede encontrar el ácido hialurónico en el humor vítreo, la glándula lacrimal, el epitelio de la córnea, la conjuntiva, y el líquido lacrimal humano.

El ácido hialurónico tiene propiedades mucoadhesivas y la capacidad de atrapar agua. Se sabe que influye en la distribución de agua en el estroma corneal. Junto con las propiedades de revestimiento del ácido hialurónico, esta característica aumenta el tiempo de permanencia precorneal y el tiempo de rotura de la película lagrimal, ofreciendo un periodo de lubricación de la superficie de la córnea más largo. Se añade actualmente ácido hialurónico a los productos para lentes de contacto, para mejorar la humectabilidad y la comodidad de las lentes de contacto. Xilin® HA contiene un agente de conservación que desaparece convirtiéndose en agua y oxígeno al entrar en contacto con el ojo. De esta manera se reduce al mínimo la eventual irritación debida a los conservantes tradicionales y se ofrece la comodidad de una forma multidosis. Todo lo que siente es el alivio calmante del gotas oftálmicas.

¿Cuándo se debe utilizar?

Xilin® HA se usa para lubricar y proteger el ojo en determinadas condiciones oculares. Xilin® HA calma los síntomas de la sensación de ojo seco tales como dolor, irritación, o sensación de arena en los ojos. Estos síntomas son la consecuencia de trastornos en la superficie del ojo que pueden aparecer por diversas razones cuando las lágrimas normales son de mala calidad o secretadas en muy poca cantidad para mantener el ojo suficientemente húmedo. Xilin® HA puede ser utilizado por los usuarios de lentes de contacto.

Modo de utilización:

La dosis habitual es de una o dos gotas aplicadas dos a cuatro veces al día, según fuera necesario, o como lo indique el profesional médico que puede aconsejar usar este producto de una manera diferente. No se requiere ajustar la dosis en los niños. Antes de abrir la nueva botella de Xilin® HA, verificar que no esté rota la cinta de seguridad de la tapa.

1. Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
2. Girar la tapa en sentido antihorario para romper el sello.
3. Retirar la tapa
4. Inclinarse la cabeza hacia atrás y mirar hacia arriba.

5. Tirar ligeramente del párpado inferior del ojo para formar una pequeña bolsa entre el párpado y el ojo.
6. Sostener la botella entre el pulgar y el dedo medio de la otra mano y ejercer con el índice una presión moderada en la base de la botella para aplicar una gota de Xilin® HA en dicha bolsa.
7. Abrir y cerrar los ojos un par de veces.
8. Si se cree que no se ha acertado en el ojo, aplicar otra gota.
9. Limpiar cuidadosamente con el pañuelo todo exceso de Xilin® HA gotas oftálmicas alrededor del párpado.
10. Volver a poner la tapa en el recipiente, tratando de no tocar la punta del aplicador, incluso con el ojo los dedos.
11. Lavar bien las manos después de la utilización.
12. Esperar al menos 30 minutos antes de la aplicación de otros medicamentos oftálmicos
13. Si no está seguro de la manera de utilizar Xilin Gel o si el estado oftálmico persiste, consultar con un médico, farmacéutico, u óptico.

Precauciones y advertencias:

- No utilizar este producto si el anillo de seguridad de la tapa de la botella está roto.
- No utilizar este producto en caso de alergia a uno de los componentes.
- No tocar la punta de la botella con el ojo o cualquier otra superficie.
- No compartir Xilin® HA con otra persona.
- Xilin® HA puede causar una mínima visión borrosa después de la aplicación. Esperar hasta que la vista sea clara antes de conducir o utilizar máquinas.
- Si experimenta molestias persistentes en los ojos, hinchazón o enrojecimiento del ojo, deje de usar Xilin® HA y consulte a su oftalmólogo.
- No utilizar este producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja o en la botella.
- Almacenar entre 1°C y 25°C.
- Desechar el contenido 28 días después de la primera apertura.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Sólo para uso oftálmico externo. No ingerir.
- En caso de embarazo, lactancia o si ha sufrido recientemente un procedimiento oftalmológico, consultar con el médico o farmacéutico antes de utilizar Xilin® HA.
- Desechar la botella usada de conformidad con las reglamentaciones locales en materia de gestión de desechos.



Almacenar entre 1°C y 25°C



Desechar el contenido 28 días después de la primera apertura



Precaución: lea todas las advertencias y precauciones en las instrucciones de utilización



Esterilizado usando técnicas de procesamiento aseptico

Xilin® es una marca registrada de VISUfarma
 Última revisión del texto: Julio 2020

Distribuido por VISUfarma BV

Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Países Bajos
 info@visufarma.com



Medicom Healthcare Ireland Ltd.,
 Joyce House, 21-23 Holles Street,
 Dublin 2, Irlanda.



Medicom Healthcare Ltd.,
 Lynton House, 7-12 Tavistock Square,
 Kings Cross, London, WC1H 9LT,
 Reino Unido.



0123

4-SDHY.2MD-25-ES-PV4
 AW-00091 Rev.3